

NUTRICIÓN HUMANA

LINEA DEL TIEMPO DE ENCUESTAS NUTRICIONALES

FCO.JAVIER RAMÍREZ FERMIN ZA

ENSA

ENSA 1986

Los factores de riesgo, situación de salud, demandas de salud son el resultado del contexto ecológico, demográfico, sociocultural y económico, se contemple a nivel estatal.

“Entre 1998 la obesidad y el sobrepeso aumentó de 11% a 39% entre jóvenes (mujeres) 21-19 años”

ENSA 1994

Hubieron temas relevantes en salud y peso, pero dado a aspectos referentes a morbilidad y condiciones de salud de población ha sido objeto de estudio en encuestas previas. La encuesta se concentra en condiciones de acceso, costos en s.s y calidad.

“Una prevalencia de DM mayores de 20 años un porcentaje aproximado del 6%-7%”

ENSA 2000

- Prevalencia de DM2 en adultos mayores y jóvenes + de 20 años aumento de 6%-7% en 1993 a 7%-7.5% en 200.
- La HAS tuvo una prevalencia de 23.8%, en 1993 y de 30.7% en 200.
- Datos de obesidad y sobrepeso. Los porcentajes de las 2 características juntas son cercanos a 40% en grupos de edad extremos en ambos sexos llegando hasta un 80% en mujeres 50-59 a.

ENN

ENN 1988

Hubo un vacío de información en cuanto a epidemiología de la NH.

Baja talla de las tallas en niños de 5 años 26.9%

Obesidad en jóvenes (hombres) mayores de 20 años.

ENSANUT 2016

Niños de 5-11 años prevalencia combinada del 33.2%

En hombres adolescentes presenta reducción de 34.1%-33.5% en prevalencia combinada.

Sobrepeso y obesidad en mujeres a cifras del 2012.

ENSANUT 2012

En patologías, se encontró que el 27.8% de las poblaciones tienen mayor riesgo de un alto síndrome de apnea obstructiva.

Enfermedades crónicas en adultos el 9.4% refirieron tener prediabetes.

Los adolescentes de 12-19 años una prevalencia de obesidad del 36.3%

ENSANUT 2006

Desnutrición gestacional y los primeros 2 años de vida aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por patologías infecciosas, además afecta en el desarrollo mental en esa edad.

Niños escolares se encontró prevalencia combinada de obesidad de 19.5% y en mujeres de 18-49 es de 60%

ENSANUT

ENN 1999

Se cuantifica la prevalencia de desnutrición, mala nutrición y deficiencia de nutrientes, en varios grupos de edades.

Baja tallas en niñas menores de 5 años de 21.5% obesidad en mujeres menores de 20 años.

ENURBAL

ENURBAL 1995

- Desnutrición cuando ocurre en la infancia es un gran problema en el país.
- Disminución de la desnutrición de alto riesgo fue de 5.9% a 3.7%.

ENURBAL 2002

- Se evaluó el consumo de alimentos mediante métodos cuantitativos de consumo de comida semanal.
- Niñas/Niños que presentan algún grado de desnutrición fue del 24.7% siendo un 3.6% la desnutrición de alto riesgo
- Prevalencia de sobre peso y obesidad de un 15.9%